

Buscopan® compositum I.M.



Diergeneesmiddel UDA

Analgetisch spasmolyticum voor
niet melkgevend rund, varken en hond

100 ml injectie oplossing

REG NL 8944

Samenstelling

Per ml:
scopolaminebutylbromide 4 mg;
metamizolnatrium 500 mg.

Dosering/toedieningswijze

Niet melkgevend rund

5 ml/100 kg LG i.m.

Varken

1 ml/20 kg LG i.m.

Hond

2–3 maal daags 1 ml/20 kg LG i.m.

Indicaties

Niet melkgevend rund

diarree (zie overige productinformatie);
spastische koliek; slokdarmverstopping.

Varken

spastische koliek.

Hond

spasmen in het urogenitale stelsel.

Contra-indicaties

Nier- en leveraandoeningen.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen komen
sporadisch voor:

Kans op bloedingen; maagdarimirritatie
en beschadiging; maagulcera; bloed-
beeldafwijkingen; papilnecrose van de
nier.

Waarschuwingen

In verband met mogelijke overgevoe-
ligheidsreacties direct huidcontact
vermijden. Draag daartoe handschoe-
nen. Niet samen met barbituraten,
fenybutazon of andere NSAID's
toedienen.

Wachtijdadvies

Niet melkgevend rund

slacht 15 dagen.

Varken

slacht 15 dagen.

Houdbaarheid

Vier jaar houdbaar na productie.

Niet bewaren boven 25°C.

Niet in de koelkast bewaren en niet
invriezen. Beschermen tegen vorst.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aangebroken flacon 4 weken houd-
baar.

Overige produktinformatie

Diarree.

In Veterinary Research

Communications, 15 (1991) 475–482
beschrijven F. J. Fallon e. a. het effect
van Buscopan® compositum bij kal-
verdiarree. Door toediening van 5 ml
per 50 kg lichaamsgewicht 2 x daags
gedurende 3 dagen (totaal 6 injecties)

werd een reductie bereikt van 18,7%
van het totale faecesgewicht en een
reductie van 18,4% waterverlies via de
faeces.

Scopolaminebutylbromide is een anti-
cholinergicum met grote affiniteit
voor muscarine-receptoren, onder
andere gelegen op het gladde spier-
weefsel van maagdkanaal, galwe-
gen en urinewegen. Het passeert de
bloed-liquorbarrière nauwelijks en
veroorzaakt derhalve geen centrale
effekten. Metamizolnatrium is een
centraal aangrijpend analgeticum en
antipyreticum.

Scopolaminebutylbromide is niet
werkzaam bij niet spastische koliek-
vormen. Bij intramusculaire toedie-
ning treedt de werking na 20–30
minuten in.

Verpakking

Bruin glazen injectieflacon à 100 ml
met rubberen doorsteekstop en
metalen kap in kartonnen doos.

Buiten bereik en zicht van kinderen
bewaren.

Voor Nederland:
Boehringer Ingelheim bv,
Alkmaar.

Fabrikant:
Labiana Life Sciences, S.A.,
Barcelona, Spanje.