

Buscopan® compositum



Diergeneesmiddel UDD

Analgetisch spasmolyticum voor
niet melkgevend rund, paard, varken en hond

100 ml injectie oplossing

REG NL 2982

Samenstelling

Per ml:
scopolaminebutylbromide 4 mg;
metamizolnatrium 500 mg.

Dosering/toedieningswijze

Paard

5 ml/100 kg LG i.v.

Niet melkgevend rund

5 ml/100 kg LG i.v. of i.m.

Varken

1 ml/20 kg LG i.v. of i.m.

Hond

2–3 maal daags 1 ml/20 kg LG i.v.
of i.m.

Indicaties

Paard

spastische koliek; slokdarmverstopping

Niet melkgevend rund

diarree; spastische koliek;

slokdarmverstopping

Varken

spastische koliek

Hond

spasmen in het urogenitale stelsel

Contra-indicaties

Nier- en leveraandoeningen.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen komen sporadisch voor:

Kans op bloedingen; maagdarimirritatie en beschadiging, maagulcera; bloed-

beeldafwijkingen; papilnecrose van de nier.

Waarschuwingen

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties direct huidcontact vermijden. Niet samen met barbituraten, fenylbutazon of andere NSAID's toedienen.

Wachttijdadvies

Paard

slacht 9 dagen

Niet melkgevend rund

slacht 15 dagen

Varken

slacht 15 dagen

Houdbaarheid

Vier jaar houdbaar na productie.

Niet bewaren boven 25°C.

Niet in de koelkast bewaren en niet invriezen. Beschermen tegen vorst.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aangebrouwen flacon 4 weken houdbaar.

Overige produktinformatie

Scopolaminebutylbromide is een anticholinergicum met grote affiniteit voor muscarine-receptoren, onder andere gelegen op het gladde spierweefsel van maagdkanaal, galwegen en urinewegen. Het passeert de bloed-liquorbarrière nauwelijks en

veroorzaakt derhalve geen centrale effecten. Metamizolnatrium is een centraal aangrijpend analgeticum en antipyreticum. Door toevoeging van metamizolnatrium wordt de spasmolytische werkingsduur van scopolaminebutylbromide in een coecum-ballon koliekmodel verlengd en versterkt. Scopolaminebutylbromide is niet werkzaam bij niet spastische koliekvormen. Bij intraveneuze toediening treedt het effect direct in. Bij intramusculaire toediening treedt de werking na 20–30 minuten in.

Verpakking

Bruin glazen injectieflacon à 100 ml met rubberen doorsteekstop en metalen kap in kartonnen doos.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Voor Nederland:
**Boehringer Ingelheim bv,
Alkmaar.**

Fabrikant:
Labiana Life Sciences, S.A.,
Barcelona, Spanje.