

Verpakking

Emmer à 3,5 kg met ingesloten maatbeker.

Houdbaarheidsdatum: zie etiket

Bewaarcondities

Bewaren met goed gesloten deksel. Het product moet droog gehouden worden en niet blootgesteld aan direct zonlicht.

Distributie voor Nederland

Boehringer Ingelheim bv, Alkmaar

Producent

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Reg. no: 208-R854833

Equitop Pronutrin®

Voedingssupplement voor paarden ter vermindering van gastro-intestinale stressreacties.

Met Equitop Pronutrin® heeft uw dierenarts u een voedingssupplement gegeven dat het maagslijmvlies van uw paard op een natuurlijke wijze ondersteunt en beschermt gedurende periodes van stress.

Stress en maagproblemen bij paarden.

Paarden zijn zeer gevoelig voor stressfactoren vanuit hun omgeving, door voeding of lichamelijke en/of psychische spanning. Als gevolg hiervan kan de natuurlijke bescherming van het maagslijmvlies tegen maagzuur beschadigd raken. Net als bij de mens kan dit ontsteking van het maagslijmvlies en maagzweren tot gevolg hebben. Vaak is het zeer moeilijk de vroege stadia – en zelfs de ernstige gevallen – van maagzweren bij paarden te ontdekken. Veelal zijn de symptomen specifiek zoals een matige gezondheidsstatus, verminderde of selectieve eetlust, gewichtsverlies, verminderde prestaties, lusteloosheid of diarree.

Andere specifieke symptomen van maagslijmvliesproblemen kunnen klachten zijn zoals veelvuldig terugkerende koliek (speciaal na het eten), tandenknarsen, boeren, veel flehmen, speekselen, kribbebijten of een stinkende adem. Veulens hebben vaak problemen gedurende de eerste levensmaanden (tandenknarsen, speekselen of op de rug liggen) en bij het spenen. De enige betrouwbare

methode om maagzweren vast te stellen is gastroscopie door uw dierenarts.

Hoe werkt Equitop Pronutrin®?

Het werkzame bestanddeel van Equitop Pronutrin® is Apolactol™, een gepatenteerde combinatie van pectine vezels, glycerine en lecithine. De eigenschappen van de verschillende componenten van Apolactol™ dragen bij aan een uitgebreid dieet-effect. Pectine voorkomt de toename van maagzuur en stabiliseert de natuurlijke balans van het maagslijmvlies. De lecithine en glycerine componenten verstevigen de hydrofobe bescherm laag op het maagslijmvlies. Op deze wijze biedt Apolactol™ een dubbele natuurlijke bescherming van het gevoelige slijmvlies. Het stabiliseert en herstelt de bescherming tegen de agressieve maagsappen en tegelijkertijd voorkomt het een overmaat aan maagzuur in de maag.

Wanneer kan Equitop Pronutrin® gebruikt worden?

Paarden hebben een verhoogde kans op maagproblemen wanneer een hoog prestatieniveau verlangd wordt gedurende training of wedstrijden, bij voeding van grote hoeveelheden krachtvoer, wanneer voergif wordt beperkt of als het paard slecht wil eten. Dit treedt ook op wanneer de intervallen tussen de voergiften te lang zijn, wanneer de kwaliteit van het hooi matig is en wanneer er een

NL

4411-0510

overgang plaatsvindt van het ene type voer naar een ander voer. Verdere stress en risicofactoren zijn frequent en langdurig transport, het spenen van veulens, ranorde conflicten in de kudde, operaties en ziekte (in het bijzonder koliek).

Wetenschappelijke studies en uitgebreide veldproeven in Duitsland en Scandinavië bewijzen het positieve effect van toevoeging van Equitop Pronutrin® aan de voeding. Wanneer één of meer van de eerder genoemde

(stress)symptomen leiden tot een verdenking (of gastroscopie bewijst) dat het paard lijdt aan een ontsteking van het maagslijmvlies en/of aan maagzweren wordt toediening van Equitop Pronutrin® sterk aanbevolen.

Equitop Pronutrin® kan ook preventief worden gegeven tegen terugkeer van klachten of voorafgaand aan stress-situaties.

Voer Equitop Pronutrin® volgens de bovenstaande instructie of zoals wordt voorgeschreven door de dierenarts.

De dagelijkse dosering moet worden gemengd met het normale voer, in twee gelijke delen over de dagelijkse voeding. Bijvoorbeeld de helft van de dosering 's ochtends en de andere helft 's avonds.

Geef renpaarden en dravers de dagelijkse dosis voorafgaand aan de training/koers.

Wanneer het paard Equitop Pronutrin® slecht eet, wordt aangeraden om te starten met de helft van de dagelijkse dosering en in 2-3 dagen de dosering op te bouwen.

Indien de eetlust van het paard sterk is verminderd en het weigert de Equitop Pronutrin® op te nemen, wordt aangeraden om het product op te lossen in 4 maal zoveel water en het via een neussonde toe te dienen totdat de normale eetlust is teruggekeerd.

Bij zogende veulens kan de aanbevolen dosis Equitop Pronutrin® gemengd worden met drie volumedelen handwarm water. Na 2-3 minuten kan de ontstane slobber door middel van een spuit of een plastic fles rechtstreeks via de mond ingegeven worden.

Periode van toediening

Start met het toedienen van Equitop Pronutrin® volgens het bovenstaande schema. Ook wanneer de conditie van uw paard sneller is verbeterd of genormaliseerd wordt u geadviseerd om nog twee weken door te gaan met het supplement om terugkeer van de klachten te voorkomen. Indien nodig is continue toediening of toediening met intervallen mogelijk. In dit geval verdient het aanbeveling met uw

dierenarts te overleggen voor een definitieve beslissing of nader onderzoek gewenst is.

Wat kunt u nog meer doen?

U kunt de suppletie met Equitop Pronutrin® ondersteunen door de relevante stressfactoren zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast kan een gelijktijdige vermindering van de hoeveelheid krachtvoer en vermeerdering van de hooggift bijdragen aan een sneller en langduriger effect op maagzweren. In het algemeen worden maagzweren veel minder aangetroffen bij paarden die een meer natuurlijke leefomgeving hebben (weidegang, sociaal contact en voeding die evenredig gedurende de dag kan worden verteerd). Hieruit volgt dat eenvoudige aanpassingen in de huisvesting ook kunnen bijdragen aan het herstel van uw paard. Neem hierover gerust contact op met uw dierenarts.

Belangrijk

Equitop Pronutrin® kan zonder aarzeling worden gegeven gedurende competities of het wedstrijdseizoen. Het bevat geen doping gerelateerde substanties.

Ingrediënten

Gedroogde citruspulp, tarwezemelen, gedroogde erwtenvezels, sacharose, gedroogde appelpulp, appelextract.

Analytische samenstelling

Ruwe celstof	12,0%
Ruw vet	7,5%
Ruw eiwit	6,0%
Ruwe as	4,5%
Magnesium	0,2%

Additieven

Lecithine, glycerol, natuurlijke smaakstoffen, ethoxyquin.

Gebruiksaanwijzing voor Equitop Pronutrin®.

Dosering en gebruiksinstructies

	Dagelijkse dosis	Duur van Equitop Pronutrin® gebruik
Bij paarden met specifieke symptomen van maagdarmerirritatie (*zie onderstaande lijst)	50 g per 100 kg lg.	Totdat de symptomen verdwijnen; minstens 4 weken wordt aanbevolen
Bij paarden met endoscopisch gediagnosticeerde, ernstige maagzweren	50 g per 100 kg lg.	Gedurende minimaal 6 weken
Follow up na medicamenteuze behandeling van maagzweren	50 g per 100 kg .	Gedurende minimaal 4 weken
Na koliekchirurgie	50 g per 100 kg lg.	Gedurende minimaal 2 weken
Gedurende stressperiodes zoals zware training, spenen van veulens, transport enz.	25-50 g per 100 kg lg.	Zolang als de stresssituatie aanwezig is

* Als het paard één of meer van de volgende symptomen laat zien: slechte eetlust, gewichtsverlies, algemene lusteloosheid, diarree/slappe mest, terugkerende koliek, koliek rond voeren, speeksel, tanden knarsen, flehmen of kribbeljten. In deze gevallen kan het paard lijden aan maagdarmerirritatie.