

Insol® Dermatophyton



Suspensie voor injectie

Geïnactiveerd vaccin, voor paarden, honden en katten

Diergeneesmiddel, UDD

REG NL 9987

Samenstelling

Eén ml van het geïnactiveerde vaccin bevat:

Voor inactivatie:

Minimaal:

55 x 10⁶ microconidiën, samengesteld uit gelijke hoeveelheden van elk van de volgende schimmelstammen om tenminste voldoende bescherming te stimuleren in de konijnen-potentietest.

Maximaal:

65 x 10⁶ microconidiën, samengesteld uit gelijke hoeveelheden van elk van de volgende schimmelstammen:

- *Trichophyton verrucosum*, stam no. 410
- *Trichophyton mentagrophytes*, stam no. 1032
- *Trichophyton sarkisovii*, stam no. 551
- *Trichophyton equinum*, stam no. 381
- *Microsporium canis*, stam no. 1393
- *Microsporium canis var. distortum*, stam no. 120
- *Microsporium canis var. obesum*, stam no. 1311
- *Microsporium gypseum*, stam no. 59

Eindproduct:

Minimaal:

50 x 10⁶ microconidiën (overeenkomend met 6,25 x 10⁶ microconidiën van elke stam).

Maximaal:

60 x 10⁶ microconidiën (overeenkomend met 7,50 x 10⁶ microconidiën van elke stam).

Doeldieren

Paarden vanaf de leeftijd van 5 maanden, honden vanaf de leeftijd van 6 weken en katten vanaf de leeftijd van 10 weken.

Indicatie

Actieve immunisatie tegen dermatofytosen veroorzaakt door *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton sarkisovii*, *Trichophyton equinum*, *Microsporium canis* en *Microsporium gypseum*, met als doel de afname van het risico op een klinische infectie veroorzaakt door deze schimmelsoorten.

Behandeling van dieren geïnficeerd met dermatofytosen veroorzaakt door *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton sarkisovii*, *Trichophyton equinum*, *Microsporium canis* en *Microsporium gypseum*.

Dosering

Goed schudden voor gebruik

Profylactische toepassing:

Basis vaccinatie: tweevoudige enting, met telkens één dosis per dier, met een interval van 14 dagen.

Hervaccinatie: elke 9 maanden, tweevoudige enting, met telkens één dosis per dier, met een interval van 14 dagen.

Therapeutische toepassing:

Tweevoudige toediening, met telkens één dosis per dier, met een interval van 14 dagen.

Als geen duidelijke waarneembare genezing optreedt van de huid en het haar

twee weken na de tweede injectie, wordt een derde toediening aanbevolen.

Aanbevolen doseringen:

Diersoort: Lichaamsgewicht: Dosis in ml:

Paarden: tot 400 kg 0,3 ml
meer dan 400 kg 0,5 ml

Honden: tot 10 kg 0,3 ml
meer dan 10 kg 0,5 ml

Katten: meer dan 1,0 kg 1,0 ml

Toedieningswijze

Het wordt nadrukkelijk aanbevolen om een diepe intramusculaire injectie te geven.

De injecties dienen op verschillende plaatsen in het lichaam toegediend te worden.

Immuneitsopbouw en immuneitsduur

De bescherming wordt 5 weken na de eerste vaccinatie bereikt en houdt minimaal 9 maanden aan.

Contra-indicaties

Drachtige en lacterende dieren.

Dieren met koorts en/of symptomen van een infectie anders dan dermatofytosen.

Gestreste dieren.

Subcutane toediening.

Bijwerkingen

Een lokale, soms pijnlijke reactie kan voorkomen.

Systemische reacties zoals koorts, apathie en gebrek aan eetlust kunnen voorkomen.

Overige productinformatie

Niet mengen met andere vaccins/immunologische producten.

Waarschuwingen voor degene die het product toedient:

Vermijd contact met de huid. Spoel met water af als het vaccin per ongeluk op de huid terecht komt. Accidentele zelfinjectie kan leiden tot een milde, tijdelijke zwelling op de injectieplaats. Na accidentele zelfinjectie van het vaccin dient direct een

arts te worden geraadpleegd en moet de bijsluiter en label aan de arts worden getoond.

Wachttijdadvies

0 dagen

Bewaarcondities

Bewaren bij 2°C - 8°C (niet invriezen). De flacon in de buitenverpakking bewaren.

Ongeopende flacon is houdbaar tot op de verpakking vermelde datum.

Houdbaarheid na aanprikken: 14 dagen bij 2°C - 8°C (niet invriezen).

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Aanbevelingen afvalstadium

Lege en niet gebruikte flacons moeten worden verwijderd conform de nationale vereisten.

Verpakkingen

Glazen flacon à 2 ml, met een rubber stop en een aluminium kap, in een omdoos van 1 of 5 flacons.

Registratiehouder

Boehringer Ingelheim bv
ALKMAAR

Fabrikant

Serumwerk Memsen
27318 Hoyerhagen
Duitsland

Datum bijsluiter: 06/2002