

# Mamyzin®



Diergeneesmiddel  
REG NL 8652 UDA

## Samenstelling

penethamaathydrojodide  
(suspenderbaar poeder) 5 g  
steriel water 15 ml

of: penethamaathydrojodide 10 g  
(suspenderbaar poeder) 30 ml  
steriel water

## Eigenschappen

Mamyzin® wordt snel en volledig vanuit de injectieplaats geabsorbeerd. Penethamaathydrojodide is een zwakke base en heeft een hoge vetoplosbaarheid. Dit maakt het preparaat uitermate geschikt voor de behandeling van mastitis en respiratoire aandoeningen. Door de parenterale benadering van mastitis met Mamyzin® worden de bacteriële infectiehaarden, ondanks de verstopte melkgangen, goed bereikt. Grondig en frequent uitmelken bevordert de penetratie van Mamyzin® in de uier.

## Doeldieren en indicaties

Rund: Acute klinische en subklinische mastitis gedurende de lactatie, veroorzaakt door stafylococci en streptococci.

## Toedieningswijze en dosering

- Uitsluitend intramusculair toedienen: bij vookeur in de nek.
- 5 g penethamaat oplossen per 15 ml water, of 10 g penethamaat oplossen per 30 ml water, (steeds i.v.m. overdruk lucht terugzuigen).
- Algemeen: 10.000–15.000 I.E. penicilline (10–15 mg penethamaathydrojodide) per kg LG/dag, gedurende 3–4 dagen.  
Dit is 5–7,5 g per 500 kg LG.

## Bijwerkingen

Een overgevoeligheid voor penicilline kan optreden.

## Contra-indicaties

Niet toedienen aan dieren, waarvan bekend is dat ze overgevoelig zijn voor penicilline.

## Waarschuwing

Niet intraveneus toedienen.

## Wachttijdadvies

Melk: 72 uur na de laatste Mamyzin® toediening.  
Slacht: 10 dagen na de laatste Mamyzin® toediening.  
In twijfelgevallen eerst een urinemonster op antibiotica laten onderzoeken.

## Veiligheidsmaatregelen voor de gebruiker

- Huidcontact met Mamyzin® vermijden.  
Draag daartoe handschoenen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

## Verpakking

Doos met 10 flakons à 5 g penethamaathydrojodide: 10 flakons à 15 ml steriel water.  
Doos met 10 flakons à 10 g penethamaathydrojodide: 10 flakons à 30 ml steriel water.

## Houdbaarheid en bewaren

3 jaar houdbaar.  
Voor uiterste gebruiksdatum: Zie verpakking.  
Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

## Houdbaarheid gesuspenderd

In de koelkast 2 weken.  
Buiten de koelkast en beneden 25°C, 2 dagen.

Voor Nederland:

**Boehringer Ingelheim b.v.**  
**Alkmaar**

Fabrikant  
**Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG**  
**Heinz-Lohmann-Straße 4**  
**27472 Cuxhaven**  
**Duitsland**