

Mederantil®



Diergeneesmiddel UDD

Eetluststimulator voor rundvee

50 ml injectie oplossing

REG NL 3563

Samenstelling

Per ml:

brotizolam 0,2 mg.

Dosering/toedieningswijze

Een enkele intraveneuze injectie met 1 ml per 100 kg lichaamsgewicht (0,002 mg brotizolam per kg lichaamsgewicht).

Indicaties

Aandoeningen waarbij een eetlusttoename gewenst is.

Contra-indicaties

Verzwakte of gesedeerde dieren; gastro-intestinale aandoeningen waarbij eetluststimulering gecontra-indiceerd is; ernstige aandoeningen van lever en nieren.

Bijwerkingen

Reversibele sedatie; ataxie; omvallen.

Waarschuwingen

Het effect treedt na 1–10 minuten op. In zeldzame gevallen kan spontane reversibele collaps optreden na te snelle intraveneuze toediening. Bij symptomatische anorexie dit middel zo mogelijk slechts gebruiken naast causale therapie.

Wachttijdadvies

Melk: 0 dagen.

Slacht: 1 dag.

Houdbaarheid

3 jaar houdbaar bij een temperatuur beneden 25°C.

Overige produktinformatie

Brotizolam is een kortwerkend diazepine derivaat, dat in lage dosering een per diersoort verschillend sterke, centraal aangrijpende, eetluststimulerende werking heeft. Een klinische respons is te verwachten 1–10 minuten na intraveneuze toediening. Bij niet-primaire anorexie is geen optimale klinische respons te verwachten zonder dat aanvullende behandeling van de achterliggende oorzaak plaatsvindt.

Verpakking

Bruin glazen multidosis injectieflacon à 50 ml met rubber stop en metalen kap in kartonnen doos.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Voor Nederland:

**Boehringer Ingelheim bv,
Alkmaar.**

Fabrikant:

Labiana Life Sciences, S.A.,
Barcelona, Spanje.