

**Informations supplémentaires/Weitere Angaben/Overige informatie**

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché/Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung/Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

**België/Belgique/Belgien**  
**Luxembourg/Luxemburg**  
n.v. Boehringer Ingelheim s.a.  
Diergeneeskundige Afdeling/  
Division Vétérinaire  
Arianelaan 16 Av. Ariane  
B-1200 Brussel/Bruxelles  
Tel/Tél: +32-(0) 2 773 33 11

**Danmark**  
Boehringer Ingelheim Danmark A/S  
Strødamvej 52  
DK-2100 København ø/Copenhagen  
Tlf/Tel: +45- 39 15 88 88

**Deutschland**  
Boehringer Ingelheim  
Vetmedica GmbH  
Binger Straße 173  
D-55216 Ingelheim/ Rhein  
Tel: +49- (0) 1803 660 660

**Ελλάδα/Κύπρος**  
Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ  
Ελληνικού 2,  
GR-167 77 Ελληνικό  
Τηλ: +30- 210 8906 300

**España**  
Boehringer Ingelheim España, S.A.  
División Veterinaria  
Prat de la Ribba, s/n  
Sector Turó de Can Matas  
E-08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
Tel: +34- 93 404 51 00

**France**  
Boehringer Ingelheim France  
Division Santé Animale  
12, rue André Huet  
F-51100 Reims  
Tél: +33- (0) 3 26 50 47 50

**Ísland**  
Vistor hf.  
Hörgatún 2  
IS-210 Garðabær  
Sími: +354- 535 7000

**Italia**  
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.  
Divisione Vetmedica  
Località Prullì, 103/C  
I-50066 Reggello (Firenze)  
Tel: +39- 055-8650-1

**Malta**  
Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH  
D-55216 Ingelheim/ Rhein  
Tel: +49- 6132 77 2645

**Nederland**  
Boehringer Ingelheim bv  
Comeniusstraat 6  
NL-1817 MS Alkmaar  
Tel: +31- (0) 72 566 24 11

**Norge**  
Boehringer Ingelheim Vetmedica A/S  
Drengsrudbekken 25  
Postboks 405  
N-1373 Asker  
Tlf: +47- 66 76 13 20

**Österreich**  
**Česká republika/ Magyarország/  
Slovenská republika/ Slovenija  
Eesti/ Latvija/ Lietuva**  
Boehringer Ingelheim Austria GmbH  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Wien  
Tel: +43- (0) 1 80 105 2575

**Polska**  
Boehringer Ingelheim Sp.z o.o.  
ul. Domaniewska 41  
PL-02-672 Warszawa  
Tel: +48 (0) 22 - 699 0 699

**Portugal**  
Vetlima  
Sociedade Distribuidora de Produtos  
Agro-Pecuários, S.A.  
Av. 5 de Outubro, 35 - 3º Esq.  
P-1050-047 Lisboa  
Tel: +351- 21 354 22 11

**Suomi/Finland**  
Vetcare Oy  
PL/PB 99  
FIN-24101 Salo  
Puh/Tel: +358- (0) 20 144 3360

**Sverige**  
Boehringer Ingelheim Vetmedica  
Box 467  
S-201 24 Malmö  
Tel: +46- (0) 40 23 34 00

**United Kingdom / Ireland**  
Boehringer Ingelheim Limited  
Ellesfield Avenue  
Bracknell, Berkshire  
UK-RG12 8YS  
Tel: +44- (0) 1344 424 600

# Metacam® 20 mg/ml



Oplossing voor injectie bij rundvee, varkens en paarden

NL

**Actief bestanddeel en overige bestanddelen**

Meloxicam 20 mg/ml  
Ethanol 150 mg/ml

**Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is**  
Rundvee, varkens en paarden

**Indicaties**

**Rundvee:** Voor gebruik bij acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticum therapie, om de klinische symptomen te verminderen bij rundvee. Voor gebruik bij diarree in combinatie met orale rehydratie therapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee.

Als aanvullende therapie bij de behandeling van acute mastitis, in combinatie met een antibioticum therapie.

**Varkens:** Voor gebruik bij niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen.

Als toegevoegde therapie bij de behandeling van purperale septicemie en toxinemie (mastitis-metritis-agalactie syndroom) met een geschikte antibioticum therapie.

**Paarden:** Voor gebruik ter verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Voor het verlichten van pijn bij koliek.

**Dosering voor elk doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningswegen**

**Rundvee:** Een éénmalige subcutane of intraveneuze injectie van 0,5 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,5 ml/100 kg lichaamsgewicht), in combinatie met een geschikte antibioticum therapie of orale rehydratie therapie, indien passend.

**Varkens:** Een éénmalige intramusculaire injectie van 0,4 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,0 ml/ 100 kg lichaamsgewicht), waar nodig in combinatie met een therapie met antibiotica. Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven.

**Paarden:** Een éénmalige intraveneuze injectie van 0,6 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 3,0 ml/ 100 kg lichaamsgewicht). Ter verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat kan Metacam® 15 mg/ml orale suspensie gebruikt worden voor continuering van de behandeling in een dosering van 0,6 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht, 24 uur na toediening van de injectie.

**Aanwijzingen voor een juiste toediening**

Vermijd contaminatie tijdens het gebruik.

**Contra-indicaties**

Niet gebruiken bij paarden jonger dan 6 weken.

Niet gebruiken bij drachtige en lacterende merries.

Niet gebruiken bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.

Niet gebruiken bij dieren die lijden aan een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen, of als er aanwijzingen zijn voor ulcerogene gastro-intestinale lesies.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Voor de behandeling van diarree bij rundvee, niet gebruiken bij dieren jonger dan één week.

**Bijwerkingen**

Door rundvee en varkens wordt zowel de subcutane, de intramusculaire als de intraveneuze toediening goed verdragen; slechts een geringe kortdurende zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening wordt in minder dan 10 % van het rundvee, behandeld in het klinisch onderzoek, gezien.

Bij paarden kunnen anafylactische reacties optreden die symptomatisch behandeld dienen te worden. Een

voorbijgaande zwelling op de plaats van injectie, welke zonder behandeling verdwijnt, kan optreden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

**Speciale waarschuwingen**

Indien bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt en dient een dierenarts te worden geraadpleegd.

Vermijd het gebruik bij zeer ernstig gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren waarbij parenterale rehydratie noodzakelijk is, aangezien er dan potentieel risico van verhoogde nefrotoxiciteit is.

In geval van onvoldoende verlichting van pijn bij de behandeling van koliek bij paarden dient een zorgvuldige her-evaluatie van de diagnose gemaakt te worden omdat dit aan kan geven dat chirurgische behandeling nodig is.

Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroiden, andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen of met anticoagulantia.

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen. Accidentele zelf-injectie kan pijn doen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAID's moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

In geval van accidentele zelf-injectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiting of het etiket te worden getoond.

**Wachtijd**

Rundvee: (orgaan)vlees: 15 dagen; melk: 5 dagen

Varkens: (orgaan)vlees: 5 dagen

Paarden: (orgaan)vlees: 5 dagen

**Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren**

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.

Niet te gebruiken na de vervaldatum (EXP) vermeld op de doos en de injectieflacon.

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen.

**Verpakkingsgrootte**

Kartonnen doos met 1 of 12 kleurloze glazen injectieflacon(s) die ieder 50 of 100 ml bevatten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein, Duitsland

Fabrikant  
Labiana Life Sciences S.A.  
Venus, 26  
Can Parellada Industrial  
08228 Terrassa, Spanje

De datum waarop de bijsluiting voor het laatst is herzien: 01. 2006