

**België/Belgique/Belgien**  
**Luxembourg/Luxemburg**  
 SCS Boehringer Ingelheim Comm.V  
 Diergeneeskundige Afdeling/  
 Division Vétérinaire  
 Arianelaan16 Av. Ariane  
 B-1200 Brussel/Bruxelles  
 Tel/Tél: +32-(0) 2 773 33 11

**Danmark**  
 Boehringer Ingelheim Danmark A/S  
 Strødamvej 52  
 DK-2100 København Ø/Copenhagen  
 Tlf/Tel: +45- 39 15 88 88

**Deutschland**  
 Boehringer Ingelheim  
 Vetmedica GmbH  
 Binger Straße 173  
 D-55216 Ingelheim/ Rhein  
 Tel: +49- (0) 1803 660 660

**Ελλάδα/ Κύπρος/ Malta**  
 Boehringer Ingelheim  
 Animal Health GmbH  
 Binger Straße 173  
 D-55216 Ingelheim/ Rhein  
 Tel: +49- 6132 77 2645

**España**  
 Boehringer Ingelheim España, S.A.  
 División Veterinaria  
 Prat de la Riba, s/n  
 Sector Turó de Can Matas  
 E-08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
 Tel: +34- 93 404 51 00

**France**  
 Boehringer Ingelheim France  
 Division Santé Animale  
 12, rue André Huet  
 F-51100 Reims  
 Tél: +33- (0) 3 26 50 47 50

**Ísland**  
 Vístor hf.  
 Hörgatún 2  
 IS-210 Garðabær  
 Sími: +354- 535 7000

**Italia**  
 Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.  
 Divisione Vetmedica  
 Località Prulli, 103/C  
 I-50066 Reggello (Firenze)  
 Tel: +39- 055-8650-1

**Nederland**  
 Boehringer Ingelheim bv  
 Comeniusstraat 6  
 NL-1817 MS Alkmaar  
 Tel: +31- (0) 72 566 24 11

**Norge**  
 Boehringer Ingelheim Vetmedica A/S  
 Drengsrudbekken 25  
 Postboks 405  
 N-1373 Asker  
 Tlf: +47- 66 76 13 20

**Österreich**  
**Česká republika/ Magyarország/ Slovenská republika/ Slovenija Eesti/ Latvija/ Lietuva Република България/ România**  
 Boehringer Ingelheim Austria GmbH  
 Animal Health  
 Dr. Boehringer Gasse 5-11  
 A-1121 Wien  
 Tel: +43- (0) 1-80 105 2875

**Polska**  
 Boehringer Ingelheim Sp.z o.o.  
 ul. Wołoska 5  
 PL-02-672 Warszawa  
 Tel: +48 (0) 22 – 699 0 699

**Portugal**  
 Vetlima  
 Sociedade Distribuidora de Produtos  
 Agro-Pecuários, S.A.  
 Av. 5 de Outubro, 35 - 3º Esq.  
 P-1050-047 Lisboa  
 Tel: +351- 21 354 22 11

**Suomi/Finland**  
 Vetcare Oy  
 PL/PB 99  
 FIN-24101 Salo  
 Puh/Tel: +358- (0) 20 144 3360

**Sverige**  
 Boehringer Ingelheim Vetmedica  
 Box 467  
 S-201 24 Malmö  
 Tel: +46- (0) 40 23 34 00

**United Kingdom/Ireland**  
 Boehringer Ingelheim Limited  
 Ellesfield Avenue  
 Bracknell, Berkshire  
 UK-RG12 8YS  
 Tel: +44- (0) 1344 424 600

# Metacam®

**15 mg/ml suspensie voor oraal gebruik voor paarden**  
**Meloxicam**

**NL**

**Registratiehouder en Producent**  
 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
 55216 Ingelheim/Rhein  
 Duitsland

**Werkzaam bestanddeel**  
 Meloxicam 15 mg/ml

## Indicaties

Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

## Contra-indicaties

Niet gebruiken bij drachtige of melkgevend merries.  
 Niet voor gebruik bij dieren die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen.  
 Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.  
 Niet gebruiken bij paarden jonger dan 6 weken.

## Bijwerkingen

Individuele gevallen van bijwerkingen, die kenmerkend zijn voor NSAID's, zijn waargenomen tijdens klinisch onderzoek (lichte urticaria, diarree). De symptomen waren reversibel.  
 Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## Doelieldier

Paard

## Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg

Orale suspensie, dosering van 0,6 mg per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag, tot maximaal 14 dagen.

## Wijze van toediening en de toedieningsweg

Goed schudden voor gebruik. Dient te worden toegediend gemengd met een kleine hoeveelheid voer, vóór het voeren, of direct in de mond.

De suspensie dient te worden gegeven met het Metacam® maatspuitje dat is meegeleverd in de verpakking. De spuit past op het flesje en heeft een verdeling op basis van kg lichaamsgewicht. Vermijd contaminatie tijdens gebruik.

## Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

## Wachttijd

(Orgaan)Vlees: 3 dagen.

## Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.

Voor dit diergeneesmiddel is er geen speciale bewaartemperatuur.

Sluit na toediening van het geneesmiddel het flesje door de dop erop te doen, spoel het maatspuitje met warm water en laat het drogen.

Niet gebruiken na de vervaldatum (EXP) vermeld op de verpakking en het flesje.

Houdbaarheid na eerste opening van container : 6 maanden.



## Speciale waarschuwingen

De behandeling dient gestaakt te worden, als er bijwerkingen voorkomen. Een dierenarts dient te worden geraadpleegd. Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel verhoogd risico van nefrotoxiciteit. Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroiden, andere NSAID's of met anticoagulantia.

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAID's moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

## Verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

## De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

06.2007

## Overige informatie

100 of 250 ml fles.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.