

# Novem<sup>®</sup> 20 mg/ml



## oplossing voor injectie bij rundvee en varkens

Meloxicam 20 mg/ml

### Overige bestanddelen

Ethanol 150 mg/ml

### Doeldieren waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rundvee en varkens

### Indicaties

#### Rundvee:

Voor gebruik bij acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibiotica therapie, om de klinische symptomen te verminderen bij rundvee. Voor gebruik bij diarree in combinatie met orale rehydratie therapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee.

Als aanvullende therapie bij de behandeling van acute mastitis, in combinatie met een antibioticum therapie.

#### Varkens:

Voor gebruik bij niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen.

Als toegevoegde therapie bij de behandeling van purperale septikemie en toxinemie (mastitis-metritis-agalactie syndroom) met een geschikte antibiotica therapie.

### Dosering voor elk doeldier

#### Rundvee:

Een éénmalige subcutane injectie van 0,5 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,5 ml/100 kg lichaamsgewicht), in combinatie met een geschikte antibioticum therapie of orale rehydratie therapie, indien passend.

#### Varkens:

Een éénmalige intramusculaire injectie van 0,4 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,0 ml/100 kg lichaamsgewicht), waar nodig in combinatie met een therapie met antibiotica. Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven.

### Aanwijzingen voor een juiste toediening

Vermijd contaminatie tijdens het gebruik.

### Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren die lijden aan een verminderde lever-, hart-of nierfunctie en hemorrhagische aandoeningen, of als er aanwijzingen zijn voor ulcerogene gastro-intestinale lesies of een individuele overgevoeligheid voor het product.

Voor de behandeling van diarree bij rundvee, niet gebruiken bij dieren jonger dan één week.

### Bijwerkingen

Zowel de subcutane als de intramusculaire toediening wordt goed verdragen; slechts een geringe kortdurende zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening wordt in minder dan 10 % van het

rundvee, behandeld in het klinisch onderzoek, gezien.

Indien u andere bijwerkingen vaststelt, gelieve uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

### Speciale waarschuwingen

Vermijd het gebruik bij zeer ernstig gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren waarbij parenterale rehydratie noodzakelijk is, aangezien er dan potentieel risico van verhoogde nefrotoxiciteit is.

Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroiden, andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen of met anticoagulantia.

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen. Accidentele zelf-injectie kan pijn doen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAID's moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

In geval van accidentele zelf-injectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiters of het etiket te worden getoond.

### Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Houdbaarheid aangebroken flacon: 28 dagen. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos en de fles.

### Verpakkingsgrootte

50 en 100 ml injectie flacons.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

### Wachttijd

Rundvee: vlees en ingewanden: 15 dagen;

melk: 5 dagen

Varkens: vlees en ingewanden: 5 dagen

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Afgifte op diergeneeskundig voorschrift.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

**Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH**  
55216 Ingelheim/Rhein, Duitsland

Fabrikant  
Labiana Life Sciences S.A.  
Venus, 26  
Can Parellada Industrial  
08228 Terrassa, Spanje

De datum waarop de bijsluiters voor het laatst is herzien: 02.2005

### Overige informatie

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

### België/Belgique/Belgien

#### Luxembourg/Luxemburg

n.v. Boehringer Ingelheim s.a.  
Diergeneeskundige Afdeling/  
Division Vétérinaire  
Arianelaan 16 Av. Ariane  
B-1200 Brussel/Bruxelles  
Tel/Tél: +32-(0) 2 773 33 11

#### Česká republika/Magyarország/Polska/

#### Slovenská republika/Slovenija

Boehringer Ingelheim Austria GmbH  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Wien  
Tel: +43- 1 80 105 2575

### Danmark

#### Eesti/Latvija/Lietuva

Boehringer Ingelheim Danmark A/S  
Strødamvej 52  
DK-2100 København Ø/Copenhagen  
Tlf/Tel: +45- 39 15 88 88

### Deutschland

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
Binger Straße 173  
D-55216 Ingelheim/Rhein  
Tel: +49- (0) 1803 660 660

### Ελλάδα/Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ελλάς AE  
Ελληνικόν 2,  
GR-167 77 Ελληνικό  
Τηλ: +30- 210 8906 300

### España

Boehringer Ingelheim España, S.A.  
División Veterinaria  
Prat de la Riba, s/n  
Sector Turó de Can Matas  
E-08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
Tel: +34- 93 404 51 00

### France

Boehringer Ingelheim France  
Division Santé Animale  
12, rue André Huet - B.P. 292  
F-51060 Reims Cedex  
Tél: +33- (0) 3 26 50 47 50

### Ísland

Vistor hf.  
Hörgatún 2  
IS-210 Garðabær  
Sími: +354- 535 7000

### Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.  
Divisione Vetmedica  
Località Prulli, 103/C  
I-50066 Reggello (Firenze)  
Tel: +39- 055-8650-1

### Malta

Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein  
Tel: +49- 6132 77 2645

### Nederland

Boehringer Ingelheim bv  
Comeniusstraat 6  
NL-1817 MS Alkmaar  
Tel: +31- (0) 72 566 24 11

### Norge

Boehringer Ingelheim Vetmedica A/S  
Drengsrudbekken 25  
Postboks 405  
N-1373 Asker  
Tlf: +47-66 76 13 20

### Österreich

Boehringer Ingelheim Austria GmbH  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Wien  
Tel: +43- (0) 1-80 105 0

### Portugal

Vetlima  
Sociedade Distribuidora de Produtos  
Agro-Pecuários, S.A.  
Av. 5 de Outubro, 35 - 3º Esq.  
P-1050-047 Lisboa  
Tel: +351- 21 354 22 11

### Suomi/Finland

Vetcare Oy  
PL/PB 99  
FIN-24101 Salo  
Puh/Tel: +358- (0) 20 144 3360

### Sverige

Boehringer Ingelheim Vetmedica  
Box 467  
S-201 24 Malmö  
Tel: +46- (0) 40 23 34 00

### United Kingdom/Ireland

Boehringer Ingelheim Limited  
Ellesfield Avenue  
Bracknell, Berkshire  
UK-RG12 8YS  
Tel: +44- (0) 1344 424 600