

Novem[®] 5mg/ml



Oplossing voor injectie bij rundvee en varkens

Meloxicam 5 mg/ml
Overige bestanddelen: Ethanol 150 mg/ml

Doeldieren
Rundvee (kalveren en jongvee) en varkens.

Indicatie
Rundvee:
Voor gebruik bij acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibiotica therapie, om de klinische symptomen te verminderen. Voor gebruik bij diarree in combinatie met orale rehydratie therapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee.
Varkens:
Voor gebruik bij niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen.

Dosering voor elk doeldier
Rundvee:
Een éénmalige subcutane injectie van 0,5 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 10,0 ml/100 kg lichaamsgewicht), in combinatie met een geschikte antibioticum therapie of orale rehydratie therapie, indien passend.
Varkens:
Een éénmalige intramusculaire injectie van 0,4 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht (dat wil zeggen 2,0 ml/25 kg lichaamsgewicht). Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Vermijd contaminatie tijdens het gebruik.

Wijze van toediening
Zie „Dosering voor elk doeldier“.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij dieren die lijden aan een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen, of als er aanwijzingen zijn voor ulcerogene gastro-intestinale lesies of een individuele overgevoeligheid voor het product.
Voor de behandeling van diarree bij rundvee, niet gebruiken bij dieren jonger dan één week.

Bijwerkingen
Zowel de subcutane als de intramusculaire toediening worden goed verdragen; slechts een geringe kortdurende zwelling op de plaats van de injectie na subcutane toediening wordt in minder dan 10% van het rundvee, behandeld in het klinisch onderzoek, gezien.
Indien u andere bijwerkingen vaststelt, gelieve uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Speciale waarschuwingen
Vermijd het gebruik bij zeer ernstig gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren waarbij parenterale rehydratie noodzakelijk is, aangezien er dan potentieel risico van verhoogde nefrotoxiciteit is.
Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroiden, andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen of met anticoagulantia.
In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.
Accidentele zelf-injectie kan pijn doen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAID's moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
In geval van accidentele zelf-injectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Speciale voorzorgen bij bewaren
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Niet bewaren boven 25°C.
Houdbaarheid na aanbreken van de flacon: 28 dagen.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos en de fles.

Verpakkingsgrootte
Kartonnen doos met 1 of 12 kleurloze glazen injectie-flacon(s) van 100 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Wachtijd
Rundvee: Vlees en ingewanden: 15 dagen
Varkens: Vlees en ingewanden: 5 dagen
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
Diergeneeskundig voorschrift.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Duitsland

Fabrikant
Labiana Life Sciences S.A.
Venus, 26
Can Parellada Industrial
08228 Terrassa
Spanje

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien: 08.2005

Overige informatie

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
n.v. Boehringer Ingelheim s.a.
Diergeneeskundige Afdeling/
Division Vétérinaire
Arianelaan 16 Av. Ariane
B-1200 Brussel/Bruxelles
Tel/Tél: +32-(0) 2 773 33 11

**Česká republika/Magyarország/Polska/
Slovenská republika/Slovenija**
Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien
Tel: +43- 1 80 105 2575

Danmark
Eesti/Latvija/Lietuva
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
DK-2100 København Ø/Copenhagen
Tlf/Tel: +45- 39 15 88 88

Deutschland
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim/Rhein
Tel: +49- (0) 1803 660 660

Ελλάδα/Κύπρος
Boehringer Ingelheim Ελλάς AE
Ελληνικού 2,
GR-167 77 Ελληνικό
Τηλ: +30- 210 8906 300

España
Boehringer Ingelheim España, S.A.
División Veterinaria
Prat de la Riba, s/n
Sector Turó de Can Matas
E-08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel: +34- 93 404 51 00

France
Boehringer Ingelheim France
Division Santé Animale
12, rue André Huet - B.P. 292
F-51060 Reims Cedex
Tél: +33- (0) 3 26 50 47 50

Ísland
Vistor hf.
Hörgatún 2
IS-210 Garðabær
Sími: +354- 535 7000

Italia
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Divisione Vetmedica
Località Prullì, 103/C
I-50066 Reggello (Firenze)
Tel: +39- 055-8650-1

Malta
Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
D-55216 Ingelheim/Rhein
Tel: +49- 6132 77 2645

Nederland
Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
NL-1817 MS Alkmaar
Tel: +31- (0) 72 566 24 11

Norge
Boehringer Ingelheim Vetmedica A/S
Drengsrudbekken 25
Postboks 405
N-1373 Asker
Tlf: +47-66 76 13 20

Österreich
Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien
Tel: +43- (0) 1-80 105 0

Portugal
Vetlima
Sociedade Distribuidora de Produtos
Agro-Pecuários, S.A.
Av. 5 de Outubro, 35 - 3º Esq.
P-1050-047 Lisboa
Tel: +351- 21 354 22 11

Suomi/Finland
Vetcare Oy
PL/PB 99
FIN-24101 Salo
Puh/Tel: +358- (0) 20 144 3360

Sverige
Boehringer Ingelheim Vetmedica
Box 467
S-201 24 Malmö
Tel: +46- (0) 40 23 34 00

United Kingdom/Ireland
Boehringer Ingelheim Limited
Ellesfield Avenue
Bracknell, Berkshire
UK-RG12 8YS
Tel: +44- (0) 1344 424 600