

Ventipulmin[®] granulaat



Diergeneesmiddel UDA

Granulaat voor orale toediening aan paarden.

Toelatingsnummer REG NL 7075

Samenstelling

Per gram granulaat:

0.016 mg clenbuterolhydrochloride; overeenkomend met 0.014 mg clenbuterol.

Dosering

5 g granulaat per 100 kg lichaamsgewicht, 2 x daags met ca. 12 uur tussentijd (minimaal 8 uur) (dit is 1,6 mcg clenbuterolhydrochloride per kg lichaamsgewicht per dag)

Behandelingsduur: maximaal 10 achtereenvolgende dagen.

Een maatlepel bevat ca. 10 g granulaat.

Toedieningswijze

Oraal, door of over het voer (eventueel licht bevochtigen).

Indicaties

Aandoeningen waarbij bronchospasmen een rol spelen.

Aandoeningen waarbij secreet, afwijkend wat betreft hoeveelheid en/of samenstelling, in de luchtwegen aanwezig is.

Contra-indicaties

Vanwege de tocolytische werking van clenbuterol dient de toepassing van dit diergeneesmiddel bij drachtige dieren tenminste 2 dagen voor de verwachte partus te worden gestaakt.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen.

stijging hartslagfrequentie
zweeten

bloeddrukval

nervositeit

sloomheid

Deze verschijnselen zijn van voorbijgaande aard.

Waarschuwingen

Nauwkeurig doseren, een lange periode tussen medicaties niet compenseren met een hogere dosis.

Regelmatig drinkwater geven, met name aan dieren die sterk zweeten. Zonodig huisvestingsomstandigheden (ventilatie) verbeteren; vermijd stof.

Bij toediening aan zogende merries moet rekening worden gehouden met het feit dat uitscheiding in de melk kan plaatsvinden.

Voor dieren met ernstige benauwdheid kunnen bij orale medicatie opname problemen ontstaan. Een injecteerbare toedieningsvorm (Ventipulmin injectie) kan dan geïndiceerd zijn.

Vermijdt gelijktijdig behandelen met andere sympathicomimetica en vasodilatoren om additie van effect te voorkomen.

Algehele anesthesie (narcose) van met clenbuterol behandelde dieren kan leiden tot verstoring van het hartritme.

Gebruik van lokaal anaesthetica bij met clenbuterol behandelde dieren kan leiden tot een additief vaatverwijdend en bloeddrukverlagend effect.

Indien een gecombineerde toepassing van clenbuterol en corticoiden wordt overwogen, dient nauwkeurige veterinaire aandacht en toezicht te worden gegeven, zoals gebruikelijk is na het toepassen van 2 sterk werkende stoffen.

Wachttermijn

Voor de slacht 28 dagen.

Houdbaarheid

5 jaar bij kamertemperatuur.

Overige produktinformatie

Clenbuterol is een selectief beta-2-sympathicomimeticum met een snel optredend en lang aanhoudend bronchospasmolytisch effect. Bovendien heeft clenbuterol duidelijke secretolytische en trilhaar activerende eigenschappen.

Deze farmacologische werking, gevonden bij laboratoriumdieren, werd in uitgebreid klinisch onderzoek bij het paard ook aangetoond. Door zijn goede eigenschappen kan bij paarden met chronische luchtwegaandoening na behandeling met Ventipulmin een genezing c.q. verbetering worden vastgesteld. Een bemoeilijkte ademhaling wordt duidelijk positief beïnvloed, terwijl eventuele neusuitvloeiing en hoestfrequentie verminderen; vaak reeds na enkele dagen behandelen.

Verpakking

Pot met 500 g Ventipulmin granulaat en maatschep a 10 g.

Voor Nederland:

Boehringer Ingelheim b.v.

Alkmaar

**Boehringer
Ingelheim**

