

# Ventipulmin<sup>®</sup> Siroop



Diergeneesmiddel UDA.

Siroop voor orale toediening aan paarden.

REG NL 2529

## Samenstelling

Per ml siroop 0,025 mg clenbuterol hydrochloride.

## Dosering

4 ml siroop per 125 kg lichaamsgewicht, 2 x daags met ca. 12 uur tussentijd (minimaal 8 uur) (dit is 1,6 mcg clenbuterol per kg lichaamsgewicht per dag).

Eén slag van de pomp bevat 4 ml siroop.

Behandelingsduur: maximaal 10 achtereenvolgende dagen.

## Toedieningswijze

Oraal (door of over het voer).

## Indicaties

Aandoeningen waarbij bronchospasmen een rol spelen.

Aandoeningen waarbij secreet, afwijkend wat betreft hoeveelheid en/of samenstelling, in de luchtwegen aanwezig is.

## Contra-indicaties

Vanwege de tocolytische werking van clenbuterol dient de toepassing van dit diergeneesmiddel bij drachtige merries tenminste 2 dagen voor de verwachte partus te worden gestaakt.

## Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: stijging hartfrequentie, zweten, bloeddrukdaling, nervositeit, sloomheid. Deze verschijnselen zijn van voorbijgaande aard.

## Waarschuwingen

Bij toediening aan zogende merries moet rekening worden gehouden met het feit dat uitscheiding in de melk kan plaatsvinden.

Dit middel kan symptomen van ademhalingsinfecties doen verdwijnen zonder de infectie te genezen. Vermijdt gelijktijdig behandelen met andere sympathicomimetica of vasodilatoren om additie van effect te voorkomen.

Algehele anaesthesie (narcose) van met clenbuterol behandelde dieren kan leiden tot een additief vaatverwijdend en bloeddrukverlagend effect.

Indien een gecombineerde toepassing van clenbuterol en corticosteroiden wordt overwogen, dient nauwkeurige veterinaire aandacht en toezicht te worden gegeven, zoals gebruikelijk is na het toepassen van 2 sterk werkende stoffen.

## Wachttermijn

Voor de slacht 49 dagen.

## Houdbaarheid

Bewaren beneden 25° C.

De uiterste gebruiksdatum is vermeld op het etiket.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

## Overige produktinformatie

Clenbuterol is een selectief beta-2-sympathicomimeticum met een snel optredend en lang aanhoudend bronchospasmolytisch effect.

Bovendien heeft clenbuterol duidelijke secretolytische en trilhaar activerende eigenschappen.

Deze farmacologische werking, gevonden bij laboratoriumdieren, werd in uitgebreid klinisch onderzoek bij het paard ook aangetoond. Door zijn goede eigenschappen kan bij paarden met een chronische luchtwegaandoening na behandeling met Ventipulmin<sup>®</sup> genezing c.q. verbetering worden vastgesteld. Een bemoeilijkte ademhaling wordt positief beïnvloed, terwijl eventuele neusuitvloeiing en hoestfrequentie verminderen; vaak reeds na enkele dagen behandelen.

Voor Nederland:

**Boehringer Ingelheim, bv  
Alkmaar**

Fabrikant:

**Boehringer Ingelheim  
Vetmedica Inc., Kansas,  
U.S.A.**