

# Voreen<sup>®</sup> suspensie I.M.

Diergeneesmiddel UDA

Glucocorticoïd voor rund, paard, varken, big, hond en kat.

50 ml injectiesuspensie.

REG NL 2875



## Samenstelling

Per ml:

dexamethason-21-isonicotinaat 1 mg.

## Dosering/toedieningswijze

*Rund*

éénmalig 1 ml/50 kg LG i.m.

*Paard*

éénmalig 1 ml/50 kg LG i.m.

*Varken en big*

éénmalig 1 ml/10 kg LG i.m.

*Hond en kat*

1 ml/10 kg LG i.m., eventueel na enkele dagen herhalen.

## Indicaties

*Rund*

acetonaemie; orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals: artritis, tendinitis, bursitis, tendovaginitis; allergische huidaandoeningen.

*Paard*

orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals: artritis, tendovaginitis, tendinitis; allergische huidaandoeningen; allergische aandoeningen van het respiratoire apparaat zoals C.O.P.D.

*Varken en big*

orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals: artritis; E. coli enterotoxaemie.

## *Hond en kat*

orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals: artritis; dermatosen met jeuk; allergische dermatitis; astma bronchiale.

## Contra-indicaties

Virusinfecties; diabetes mellitus; osteoporose; hartafwijkingen; nierafwijkingen; schimmelinfecties; cornea ulcera; brandwonden; toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren.

## Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- abortus in het laatste derde deel van de dracht;
- afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
- bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
- katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
- osteoporose;
- remming van de lengtegroei van beenderen;

- huidatrofie;
- diabetes mellitus;
- polyurie, polydipsie;
- polyfagie;
- euforie;
- ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
- pancreatitis;
- hyperlipidaemie;
- toename van de lipolysis;
- vette infiltratie van de lever door steroid hepatopathie;
- remming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschors systeem;
- afname van de thyroïd synthese;
- toename van de parathyroïd synthese;
- morbus Cushing.

## Waarschuwingen

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden.

## Wachtijdadvies

*Rund*

melk: 5 dagen; slacht: 16 dagen.

*Paard*

voor de slacht: 21 dagen.

*Varken en big*

voor de slacht: 28 dagen.

## Houdbaarheid

Ongeopende flacon: 3 jaar houdbaar. Niet bewaren boven 25°C.

Niet invriezen.

Bescherm tegen vorst.

Aangeprikte flacon: 28 dagen houdbaar.

Niet bewaren boven 25°C.

Niet in koelkast bewaren en niet invriezen.

Bescherm tegen vorst.

## Overige produktinformatie

Glucocorticoïd derivaat met glucocorticoïde werking en een sterk antiflogistisch en anti-inflammatoir effect. De isonicotinaat-vorm heeft een hogere potentie dan dexamethason zelf. Mede door de suspensievorm van de injectievloeistof wordt een werkingsduur van 3 à 4 dagen bereikt. Wordt lokaal en systemisch uitstekend verdragen. Heeft zeer geringe werking op water en zouthuishouding.

## Verpakking

Bruinglazen flacon à 50 ml met rubber stop en metalen kap.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Voor Nederland:

**Boehringer Ingelheim bv,  
Alkmaar.**

Fabrikant:  
Labiana Life Sciences, S.A.,  
Barcelona, Spanje.