

Lees deze bijlsluiters zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om BISOLVON Elixer forte zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijlsluiters, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
-

Inhoud van deze bijlsluiters:

1. Wat is BISOLVON Elixer forte en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u BISOLVON Elixer forte gebruikt
3. Hoe wordt BISOLVON Elixer forte gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u BISOLVON Elixer forte?

BISOLVON® Elixer forte, 8 mg/5 ml drank

- Het werkzame bestanddeel is: 8 mg broomhexinehydrochloride per 5 ml.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn vloeibaar maltitol (E965), sucralose (E955), benzoëzuur (E210), kersenaroma, chocola-aroma, levomenthol en gedemineraliseerd water

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:

Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel: (072) 566 24 68
e-mail: bisolvon.info@alk.boehringer-ingelheim.com

In het register ingeschreven onder RVG 09554.

1. WAT IS BISOLVON ELIXER FORTE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BISOLVON Elixer forte is een drank met broomhexinehydrochloride.

BISOLVON Elixer forte is verkrijgbaar in bruine glazen flessen van 60, 100, 125, 200 en 250 ml met een polypropyleen maatschaaltje. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel zijn.

BISOLVON Elixer forte is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. BISOLVON Elixer forte maakt het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BISOLVON ELIXER FORTE GEBRUIKT

Gebruik BISOLVON Elixer forte niet

- Bij gebleken overgevoeligheid voor broomhexinehydrochloride of één van de overige bestanddelen.
- BISOLVON Elixer forte bevat onder andere de hulpstof vloeibare maltitol. Indien uw arts u of uw kind heeft meegedeeld dat u of uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Maltitol kan een licht laxerende werking hebben. De calorische waarde is 2,3 kcal /gram vloeibaar maltitol (2 ml BISOLVON Elixer forte bevat 1 gram vloeibaar maltitol).

Wees extra voorzichtig met BISOLVON Elixer forte

- Indien u of uw kind een maagzweer heeft of heeft gehad. Het is raadzaam om dan voor het gebruik uw arts te raadplegen.
- U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen.
- Als de hoestklachten aanhouden of zich dikwijls herhalen. Het is verstandig dan contact op te nemen met uw arts.

Zwangerschap

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van BISOLVON Elixer forte tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor de ongeboren vrucht.

Gebruik BISOLVON Elixer forte in geval van zwangerschap alleen na overleg met uw arts.

Borstvoeding

Broomhexinehydrochloride wordt uitgescheiden in de moedermelk. Het gebruik van BISOLVON Elixer forte dient daarom tijdens het geven van borstvoeding vermeden te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het gebruik van dit product kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 Mogelijke bijwerkingen). Hiermee dient rekening gehouden te worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Gebruik van BISOLVON Elixer forte in combinatie met andere geneesmiddelen

Gelijktijdig gebruik van BISOLVON Elixer forte en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel. Raadpleeg uw arts als één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

3. HOE WORDT BISOLVON ELIXER FORTE GEBRUIKT?

BISOLVON Elixer forte bevat geen suiker en kan daarom ook door diabetici worden ingenomen.

In de verpakking zit een maatschaaltje. Hierop zijn deelstrepen aangegeven in milliliters (1,25; 2,5 ml en 5 ml). U kunt hiermee de benodigde hoeveelheid afmeten. Het maatschaaltje gevuld tot aan de eerste deelstreep is 1,25 ml. Het maatschaaltje gevuld tot aan de middelste deelstreep is 2,5 ml; het maatschaaltje gevuld tot aan de bovenste deelstreep is 5 ml.

Volwassenen en kinderen boven de 10 jaar: driemaal per dag 2,5-10 ml

BISOLVON Elixer forte begint na ongeveer vijf uur te werken. Als door het loskomen van het slijm de luchtwegen gereinigd worden, vermindert het hoesten en wordt het ademen gemakkelijker. Het duurt enige dagen voor dit effect optimaal is. U moet daarom het innemen van BISOLVON Elixer forte niet te vlug staken.

Naast BISOLVON Elixer forte zijn er voor volwassenen en kinderen boven de 5 jaar BISOLVON Tabletten beschikbaar.

Voor kinderen onder 10 jaar en voor zuigelingen zijn er BISOLVON producten voor kinderen: BISOLVON Elixer (kinderen vanaf 1 tot 10 jaar) en BISOLVON Druppels (voor zuigelingen en kinderen tot 10 jaar).

Wat u moet doen wanneer u of uw kind te veel van BISOLVON Elixer forte heeft gebruikt

Het is niet waarschijnlijk dat er symptomen optreden. Mocht u of uw kind toch last krijgen, raadpleeg dan een arts.

Wat u moet doen wanneer u of uw kind vergeten is BISOLVON Elixer forte te gebruiken

Wanneer u of uw kind een dosis vergeet, kunt u of uw kind gewoon met de volgende dosis doorgaan. Neem nooit een dubbele dosis van BISOLVON Elixer forte in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met BISOLVON Elixer forte wordt gestopt

Plotseling stoppen met het gebruik van BISOLVON Elixer forte veroorzaakt geen problemen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan BISOLVON Elixer forte bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen kunnen:

- vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 personen)
- soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 personen)
- zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 personen)

De bijwerkingen zijn gerangschikt naar orgaanklasse.

Immuunsysteem

Zelden kunnen allergische reacties en ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylaxie) voorkomen.

Zenuwstelselaandoeningen

Duizeligheid kan soms optreden.

Ademhalingsstelsel

Benauwdheid als gevolg van kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) kan zelden optreden.

Maagdarmstelsel

Vaak treden lichte bijwerkingen op van het maagdarmkanaal.. Soms kan misselijkheid, braken en diarree voorkomen.

Huid en onderhuid

Zelden kan huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) optreden.

Zelden kan angioneurotisch oedeem optreden, met als verschijnselen plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie.

Algemene aandoeningen

Soms kan transpireren voorkomen.

In geval er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BISOLVON ELIXER FORTE?

BISOLVON Elixer forte buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Er is geen speciale bewaar temperatuur; niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.

Uiterste gebruiksdatum

BISOLVON Elixer forte is ongeopend houdbaar tot de aangegeven datum. Deze datum vindt u op de verpakking achter de aanduiding 'Niet te gebruiken na'. Na openen kan het product gedurende 6 maanden gebruikt worden.

Informatie voor de gebruiker

U of uw kind heeft last van vastzittende hoest. Dit komt in ons klimaat bijvoorbeeld voor als gevolg van verkoudheid.

Vastzittende hoest ontstaat als er in de luchtwegen meer slijm wordt gevormd dan normaal. Ook het inademen van prikkelende stoffen, zoals tabaksrook en uitlaatgassen kan verhoogde slijmvorming veroorzaken. Dit slijm kan dikker en taaier zijn dan normaal. Om het overtollige slijm weer kwijt te raken, maken we gebruik van een natuurlijk mechanisme: hoesten. Maar als het slijm te dik en te taai is, schiet hoesten tekort. U of uw kind hoest wel, maar er komt te weinig slijm naar boven. Het zit vast. 'Vastzittende hoest' is dus eigenlijk 'vastzittend slijm'. Om het ophoesten een handje te helpen, moet het slijm verdund worden. BISOLVON is een slijmverdunner. Het dikke, taaie slijm komt los en kan veel gemakkelijker worden opgehoest.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op

November 2006