

## **BIJSLUITER: Informatie voor de gebruiker**

### **Striverdi Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing** olodaterol

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

#### **Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Striverdi Respimat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Striverdi Respimat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Striverdi Respimat helpt mensen met chronisch obstructieve longziekte (COPD) om gemakkelijker te ademen. COPD is een chronische longziekte die kortademigheid en hoesten veroorzaakt. De term COPD omvat chronische bronchitis (ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm) en emfyseem (longaandoening als gevolg van verlies van elasticiteit van het longweefsel, met als klacht ernstige kortademigheid). Omdat COPD een chronische ziekte is, moet u Striverdi Respimat elke dag gebruiken en niet alleen als u ademhalingsproblemen of andere COPD-klachten heeft.

Striverdi Respimat bevat de werkzame stof olodaterol, een langwerkende bronchusverwijder (langwerkende beta-2-agonist) die helpt bij het openen van de luchtwegen, waardoor de lucht gemakkelijker de longen in en uit kan gaan. Regelmatig gebruik van Striverdi Respimat kan u ook helpen als u voortdurend kortademig bent door uw ziekte en het helpt om de invloed van de ziekte op uw dagelijks leven te verminderen.

#### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

##### **Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt**

- als u astma heeft (u mag dit middel niet gebruiken voor de behandeling van astma)
- als u een aandoening aan het hart heeft
- als u hoge bloeddruk heeft

- als u epilepsie heeft
- als u een bepaalde aandoening aan de schildklier (thyreotoxicose) heeft
- als u een abnormale verwijding van een slagader (aneurysma) heeft
- als u diabetes heeft
- als u een ernstig verminderde leverfunctie heeft, omdat dit middel niet onderzocht is bij deze patiëntengroep
- als u een ernstig verminderde nierfunctie heeft, omdat er weinig ervaring is met dit middel bij deze patiëntengroep
- als er voor u een operatie gepland is.

#### **Tijdens de behandeling met dit middel**

- Als u direct na het gebruik van dit middel last krijgt van een beklemd gevoel op de borst, hoesten, piepende ademhaling of kortademigheid, **stop dan met het gebruik van dit middel en neem direct contact op met uw arts.** Dit kunnen symptomen zijn van een aandoening die bronchospasme genoemd wordt (zie rubriek 4).
- Als uw ademhaling moeilijker wordt of als u direct na de inhalatie last krijgt van huiduitslag, zwelling of jeuk, stop dan met het gebruik van dit middel en neem direct contact op met uw arts (zie rubriek 4).
- Als u last krijgt van bijwerkingen die met het hart te maken hebben (versnelde hartslag, verhoging van de bloeddruk en/of verergering van symptomen als pijn op de borst) neem dan direct contact op met uw arts (zie rubriek 4).
- Als u last krijgt van spierkrampen, verminderde spierkracht of afwijkend hartritme, neem dan contact op met uw arts omdat deze symptomen verband kunnen houden met een lage kaliumconcentratie in het bloed (zie rubriek 4).

Dit middel is bedoeld voor onderhoudsbehandeling van uw chronische obstructieve longziekte (COPD). **Het mag niet worden gebruikt voor de behandeling van een plotselinge aanval van kortademigheid of piepende ademhaling.**

Gebruik dit middel niet samen met geneesmiddelen die langwerkende  $\beta$ -adrenerge agonisten bevatten, zoals salmeterol of formoterol.

Als u regelmatig geneesmiddelen gebruikt die kortwerkende  $\beta$ -adrenerge stoffen genoemd worden (bijvoorbeeld salbutamol), gebruik die dan in het vervolg alleen voor de verlichting van acute symptomen zoals kortademigheid.

#### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Dit middel mag **niet** gegeven worden aan **kinderen en jongeren tot 18 jaar**.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Vertel het vooral aan uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- bepaalde geneesmiddelen voor ademhalingsproblemen die lijken op dit middel ( $\beta$ -adrenerge stoffen). U heeft dan meer kans op bijwerkingen.
- geneesmiddelen die bètablokkers genoemd worden en die gebruikt worden voor hoge bloeddruk of andere hartproblemen (bv. propranolol), of voor de oogandoening glaucoom (bv. timolol). Dit kan het therapeutisch effect van dit middel verminderen.
- geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in het bloed verminderen, zoals:
  - steroïden (bv. prednisolon),
  - diuretica ('plasmiddelen'),
  - geneesmiddelen voor ademhalingsproblemen zoals theofylline.

Als u deze geneesmiddelen samen met dit middel gebruikt, kunt u last krijgen van spierkrampen, verminderde spierkracht of hartritmestoornissen.

- geneesmiddelen genaamd tricyclische antidepressiva of MAO-remmers (zoals selegiline of moclobemide), die gebruikt worden voor de behandeling van neurologische of psychiatrische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson of depressie; het gebruik van deze middelen vergroot de kans dat u bijwerkingen krijgt die met uw hart te maken hebben.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er is geen onderzoek verricht naar de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Wanneer u zich duizelig voelt tijdens het gebruik van dit middel moet u niet deelnemen aan het verkeer en geen gereedschap of machines gebruiken.

## **3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor inhalatie.

### **Dosering**

De aanbevolen dosering is:

Dit middel is 24 uur lang werkzaam, dus u hoeft dit middel maar **EENMAAL PER DAG** te gebruiken, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. Neem bij ieder gebruik **TWEE INHALATIES**.

Omdat COPD een chronische ziekte is, moet u dit middel elke dag gebruiken en niet alleen als u ademhalingsproblemen heeft. Neem niet meer dan de voorgeschreven dosis.

### **Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Er is geen relevante toepassing van dit middel bij kinderen en jongeren (tot 18 jaar).

Zorg ervoor, dat u precies weet hoe u uw Striverdi Respimat inhalator moet gebruiken. De instructies voor het gebruik van de Striverdi Respimat inhalator staan vermeld op de achterzijde van deze bijsluiter.

### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

U heeft een grotere kans op bijwerkingen zoals pijn op de borst, hoge of lage bloeddruk, snellere of onregelmatige hartslag, hartkloppingen, duizeligheid, zenuwachtigheid, slaapproblemen, angst, hoofdpijn, trillen, droge mond, spierkrampen, misselijkheid, vermoeidheid, algehele malaise, lage kaliumconcentratie in het bloed (dit kan spierkrampen, verminderde spierkracht of abnormaal hartritme veroorzaken), hoge bloedsuiker, of te veel zuur in het bloed (dit kan misselijkheid, braken, slapte, spierkrampen en snelle ademhaling veroorzaken).

### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Als u een dosis vergeten bent, inhaleer dan de volgende dag op het gebruikelijke tijdstip uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van dit middel. Als u stopt met het gebruik van dit middel kunnen de COPD-symptomen verergeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De evaluatie van de bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties

---

Zeer vaak:	komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak:	komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers
Soms:	komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers
Zelden:	komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers
Zeer zelden:	komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
Onbekend:	op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld

---

De hieronder gemelde bijwerkingen zijn voorgekomen bij gebruikers van dit geneesmiddel en worden ingedeeld naar frequentie, als soms of zelden.

##### Soms:

- Loopneus (nasofaryngitis)
- Duizeligheid
- Huiduitslag

##### Zelden:

- Gewrichtspijn (artralgie)
- Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

U kunt ook bijwerkingen krijgen waarvan bekend is dat ze voorkomen bij bepaalde andere geneesmiddelen voor ademhalingsproblemen die op dit middel lijken (beta-adrenerge stoffen). Deze bijwerkingen kunnen zijn: snellere of onregelmatige hartslag, hartkloppingen, pijn op de borst, hoge of lage bloeddruk, trillen, hoofdpijn, zenuwachtigheid, slaapproblemen, duizeligheid, droge mond, misselijkheid, spierkrampen, vermoeidheid, algehele malaise, lage kaliumconcentratie in het bloed (dit kan spierkrampen, verminderde spierkracht of abnormaal hartritme veroorzaken), hoge bloedsuiker, of te veel zuur in het bloed (dit kan misselijkheid, braken, slapte, spierkrampen en snellere ademhaling veroorzaken).

Na het gebruik van dit middel kunnen acute allergische reacties optreden zoals huiduitslag, netelroos (urticaria), zwelling van mond of gezicht of plotselinge ademhalingsmoeilijkheden (angioneurotisch oedeem) of andere overgevoelighedsreacties. Als dit gebeurt stop dan met het gebruik van dit middel en neem direct contact op met uw arts.

Daarnaast, zoals ook bij andere inhalatiemiddelen, kunnen sommige patiënten direct na inhalatie last krijgen van een onverwacht beklemd gevoel op de borst, hoesten, piepen of kortademigheid (bronchospasme).

##### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

#### 5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en de inhalator na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. De Striverdi Respimat inhalator moet uiterlijk 3 maanden na het eerste gebruik weggegooid worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stof in dit middel is olodaterol. De afgegeven dosis is 2,5 microgram olodaterol (als hydrochloride) per inhalatie.

De afgegeven dosis is de dosis die het mondstuk van de inhalator verlaat en dus de dosis die de patiënt inhaleert.

De andere bestanddelen in dit middel zijn: benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat, gezuiverd water, en citroenzuur (watervrij).

### **Hoe ziet Striverdi Respimat eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Striverdi Respimat 2,5 microgram bestaat uit een patroon met inhalatieoplossing en een Respimat inhalator. Voor het eerste gebruik moet de patroon in de inhalator geplaatst worden.

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Enkele verpakking:      | 1 Respimat inhalator en 1 patroon, die 60 inhalaties levert (30 therapeutische doses).                               |
| Dubbele verpakking:     | 2 enkele verpakkingen met elk 1 Respimat inhalator en 1 patroon, die 60 inhalaties levert (30 therapeutische doses). |
| Drievoudige verpakking: | 3 enkele verpakkingen met elk 1 Respimat inhalator en 1 patroon, die 60 inhalaties levert (30 therapeutische doses). |
| Achtvoudige verpakking: | 8 enkele verpakkingen met elk 1 Respimat inhalator en 1 patroon, die 60 inhalaties levert (30 therapeutische doses). |

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Boehringer Ingelheim International GmbH  
Binger Straße 173  
D-55216 Ingelheim am Rhein  
Duitsland

#### **Voor inlichtingen en correspondentie**

Boehringer Ingelheim bv  
Comeniusstraat 6  
1817 MS Alkmaar  
Tel: 0800-2255889

#### **Fabrikant**

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  
Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein  
Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 112058

**Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:**

<b>België, Luxemburg:</b>	Striverdi Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler	
<b>Bulgarije :</b>	Стриверди Респимат микрограма разтвор за инхалация	2,5
<b>Cyprus, Denemarken, Estland, Griekenland, Ierland, Ijsland, Malta, Polen, Portugal, Slowakije, Verenigd Koninkrijk:</b>	Striverdi Respimat	
<b>Duitsland:</b>	Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm/Sprühstoß Lösung zur Inhalation	
<b>Finland:</b>	Striverdi Respimat 2,5 mikrog inhalaationeste, lious	
<b>Frankrijk:</b>	Striverdi Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution à inhaler	
<b>Hongarije:</b>	Striverdi Respimat 2,5 mikrogram inhalációs oldat	
<b>Italië:</b>	Striverdi Respimat 2,5 microgrammi, soluzione per inalazione	
<b>Letland:</b>	Striverdi Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām	
<b>Liechtenstein, Oostenrijk:</b>	Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation	
<b>Litouwen:</b>	Striverdi Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis	
<b>Nederland:</b>	Striverdi Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing	
<b>Noorwegen:</b>	Striverdi Respimat	
<b>Roemenië:</b>	Striverdi Respimat 2,5 micrograme soluție de inhalat	
<b>Slovenië:</b>	Striverdi Respimat 2,5 mikrograma/vdih raztopina za inhaliranje	
<b>Spanje:</b>	Striverdi Respimat 2,5 microgramos solución para inhalación	
<b>Tsjechië:</b>	Striverdi Respimat 2,5 mikrogramů	
<b>Zweden:</b>	Striverdi Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning	

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2016**

---

## Gebruiksaanwijzing

### Introductie

Striverdi Respimat (olodaterol). Lees deze aanwijzingen voordat u Striverdi Respimat gaat gebruiken.

U hoeft deze inhalator slechts EENMAAL PER DAG te gebruiken. Neem bij ieder gebruik TWEE INHALATIES.



- Als de Striverdi Respimat langer dan 7 dagen niet is gebruikt, richt dan één inhalatie naar de grond.
- Als de Striverdi Respimat langer dan 21 dagen niet is gebruikt, herhaal dan de stappen 4 tot en met 6 onder “Gereedmaken voor het eerste gebruik” tot een wolk te zien is. Herhaal dan stap 4 tot en met 6 nog drie keer.
- Raak de prikker in de doorzichtige houder niet aan.

### Hoe onderhoudt u de Striverdi Respimat

Maak het mondstuk, inclusief het metalen deel in het mondstuk, minstens een keer in de week schoon met een vochtige doek of tissue.

Een lichte verkleuring van het mondstuk beïnvloedt de werking van de Striverdi Respimat inhalator niet.




Maak, indien nodig, de buitenkant van uw Striverdi Respimat inhalator schoon met een vochtige doek.

### Wanneer moet u een nieuwe Striverdi Respimat gaan gebruiken






- Uw Striverdi Respimat inhalator bevat 60 inhalaties (30 doses) indien gebruikt zoals aangegeven (twee inhalaties eenmaal per dag).
- De dosimeter geeft ongeveer aan hoeveel doses er nog over zijn.
- Als de dosimeter in het rode gebied van de schaalverdeling terecht komt, moet u een nieuw recept gaan halen; er is nog voor ongeveer 7 dagen (14 inhalaties) over.
- Als de dosimeter het einde van de schaalverdeling bereikt, blokkeert uw Striverdi Respimat automatisch – er kunnen dan geen doses meer vrijkomen. De doorzichtige houder kan dan niet meer gedraaid worden.
- Striverdi Respimat moet drie maanden na het eerste gebruik worden weggegooid ook al is het niet, of niet volledig, gebruikt.

### Gereedmaken voor het eerste gebruik

<p><b>1. Verwijder de doorzichtige houder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de kap gesloten.</li> <li>• Druk op de veiligheidsknop en trek met uw andere hand tegelijkertijd stevig de doorzichtige houder los.</li> </ul>	
<p><b>2. Plaats de patroon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats het smalle uiteinde van de patroon in de inhalator.</li> <li>• Plaats de inhalator op een hard oppervlak en duw deze stevig naar beneden tot deze op zijn plaats klikt.</li> </ul>	
<p><b>3. Plaats de doorzichtige houder terug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schuif de doorzichtige houder terug totdat deze klikt.</li> </ul>	



<p><b>4. Draai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de kap gesloten.</li> <li>• Draai de doorzichtige houder in de richting van de pijlen op het etiket totdat deze klikt (een halve draai).</li> </ul>	
<p><b>5. Open</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open de kap totdat deze helemaal openklapt.</li> </ul>	
<p><b>6. Druk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Richt de inhalator naar de grond.</li> <li>• Druk op de ontspanner.</li> <li>• Sluit de kap.</li> <li>• Herhaal de stappen 4-6 totdat er een wolk te zien is.</li> <li>• Herhaal de stappen 4-6 nog driemaal, <b>nadat de wolk te zien is.</b></li> </ul> <p>Uw inhalator is nu klaar voor gebruik. Deze stappen hebben geen invloed op het aantal beschikbare doses. Na het gereedmaken zal uw inhalator 60 inhalaties (komt overeen met 30 therapeutische doses) kunnen afgeven.</p>	

### Dagelijks gebruik

<p><b>DRAAI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de kap gesloten.</li> <li>• <b>DRAAI</b> de doorzichtige houder in de richting van de pijlen op het etiket totdat deze klikt (een halve draai).</li> </ul>	
--	--

<p><b>OPEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OPEN</b> de kap totdat deze helemaal openklapt.</li> </ul>	
<p><b>DRUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adem langzaam en volledig uit.</li> <li>• Sluit uw lippen om het uiteinde van het mondstuk zonder de luchtgaten af te dekken. Richt de inhalator naar uw keelholte.</li> <li>• Terwijl u langzaam en diep inademt door uw mond, <b>DRUKT</b> u op de ontspanner en blijft u langzaam zo lang als voor u comfortabel is inademen.</li> <li>• Houd uw adem 10 seconden in of zo lang als voor u comfortabel is.</li> <li>• Herhaal Draai, Open, Druk, zodat u in totaal 2 inhalaties binnenkrijgt.</li> <li>• Sluit de kap tot het volgende gebruik van de inhalator.</li> </ul>	

### Antwoorden op veelgestelde vragen

#### Het is lastig om de patroon voldoende diep te plaatsen.

##### **Heeft u per ongeluk de doorzichtige houder gedraaid voor het plaatsen van de patroon?**

Open de kap, druk op de ontspanner, plaats vervolgens de patroon.

##### **Heeft u de patroon geplaatst met het brede uiteinde eerst?**

Plaats de patroon met het smalle uiteinde eerst.

#### Ik kan de ontspanner niet indrukken.

##### **Heeft u de doorzichtige houder gedraaid?**

Zo niet, draai de doorzichtige houder in een continue beweging totdat deze klikt (een halve draai).

##### **Geeft de dosimeter op de Striverdi Respimat nul aan?**

De Striverdi Respimat inhalator blokkeert na 60 inhalaties (30 therapeutische doses). Maak uw nieuwe Striverdi Respimat inhalator gereed en gebruik deze.

#### Ik kan de doorzichtige houder niet draaien.

##### **Heeft u de doorzichtige houder al gedraaid?**

Als de doorzichtige houder al gedraaid is, volgt u de stappen “OPEN” en “DRUK”, onder “Dagelijks gebruik” om uw geneesmiddel te krijgen.

##### **Geeft de dosimeter op de Striverdi Respimat nul aan?**

De Striverdi Respimat inhalator is geblokkeerd na 60 inhalaties (30 therapeutische doses). Maak uw nieuwe Striverdi Respimat inhalator gereed en gebruik deze.

### **De dosismeter op de Striverdi Respimat geeft te snel nul aan.**

#### **Heeft u Striverdi Respimat gebruikt zoals aangegeven (twee inhalaties/eenmaal daags)?**

Bij eenmaal daags twee inhalaties gaat Striverdi Respimat 30 dagen mee.

#### **Heeft u de doorzichtige houder gedraaid voordat u de patroon plaatste?**

De dosismeter telt elke draai van de doorzichtige houder, of de patroon geplaatst is of niet.

#### **Heeft u vaak in de lucht gespoten om te controleren of de Striverdi Respimat werkte?**

Wanneer u de Striverdi Respimat eenmaal gereed heeft gemaakt voor gebruik, is het bij dagelijks gebruik niet meer nodig om te testen.

#### **Heeft u de patroon in een gebruikte Striverdi Respimat geplaatst?**

Plaats altijd een nieuwe patroon in een **NIEUWE** Striverdi Respimat.

### **Mijn Striverdi Respimat spuit automatisch.**

#### **Was de kap open toen u de doorzichtige houder draaide?**

Sluit de kap, draai vervolgens de doorzichtige houder.

#### **Heeft u de ontspanner ingedrukt toen u de doorzichtige houder draaide?**

Sluit de kap, zodat de ontspanner bedekt is, draai vervolgens de doorzichtige houder.

#### **Bent u gestopt terwijl u de doorzichtige houder draaide, nog voordat deze klikte?**

Draai de doorzichtige houder in een continue beweging totdat deze klikt (een halve draai).

### **Mijn Striverdi Respimat spuit niet.**

#### **Heeft u een patroon geplaatst?**

Zo niet, plaats een patroon.

#### **Heeft u Draai, Open, Druk minder dan drie keer herhaald nadat u de patroon heeft geplaatst?**

Herhaal Draai, Open, Druk drie keer na het plaatsen van de patroon zoals afgebeeld in de stappen 4 tot 6 onder "Gereedmaken voor het eerste gebruik".

#### **Geeft de dosismeter op de Striverdi Respimat nul aan?**

Wanneer de dosismeter 0 aangeeft, dan heeft u al uw medicatie gebruikt en is de inhalator geblokkeerd.

Als uw Striverdi Respimat eenmaal in elkaar is gezet, mag de doorzichtige houder of de patroon niet meer worden verwijderd. Plaats altijd een nieuwe patroon in een **NIEUWE** Striverdi Respimat.