

Pradaxa®

dabigatran etexilaat

- Zorg ervoor dat u altijd deze kaart bij u heeft
- Zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie heeft

januari 2018



Beste patiënt,

Uw arts heeft een behandeling met Pradaxa® ingesteld. Om Pradaxa® veilig te gebruiken moet u op de hoogte zijn van de belangrijke informatie die op de kaart staat.

Omdat deze patiëntenwaarschuwingskaart belangrijke informatie bevat over uw behandeling, moet u de kaart altijd bij u hebben, zodat zorgverleners weten dat u met Pradaxa® wordt behandeld.



1

Pradaxa® Informatie voor de patiënt

Over uw behandeling

- Pradaxa® verdunt het bloed, dit voorkomt dat u gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- Houd u aan de instructies van uw arts als u Pradaxa® gebruikt. Sla geen dosis over en stop niet met het gebruik van Pradaxa® zonder met uw arts te overleggen.
- Informeer uw arts over alle geneesmiddelen die u momenteel gebruikt.
- Informeer uw arts over uw gebruik van Pradaxa® vóór een operatieve/invasieve ingreep.

2

- Pradaxa® kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Slik de capsule in zijn geheel door met een glas water. U mag de capsule niet openbreken, u mag er niet op kauwen en u mag de bolletjes er niet uithalen.

Wanneer moet u medische hulp inroepen

- Door gebruik van Pradaxa® kan de kans op bloedingen toenemen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende mogelijke tekenen en symptomen van een bloeding: zwelling, ongemak, ongebruikelijke pijn of hoofdpijn, duizeligheid, bleekheid, zwakte,

3

ongebruikelijke blauwe plekken, bloedneus, bloedend tandvlees, ongebruikelijk lang bloeden na een snijwond, ongebruikelijke menstruatie- of vaginale bloedingen, bloed in uw urine waardoor de urine roze of bruin van kleur is, rode/zwarte ontlasting, ophoesten van bloed, braken van bloed of koffiedikachtig braaksel.

- Als u valt of een letsel oploopt (vooral als u uw hoofd stoot), roep dan direct medische hulp in.
- Stop niet met het gebruik van Pradaxa® zonder met uw arts te overleggen, als u last krijgt van brandend maagzuur, misselijkheid, braken, maagklachten, een opgeblazen gevoel of pijn in de bovenbuik.

4

Pradaxa® Informatie voor zorgverleners

- Pradaxa® is een oraal antistollingsmiddel (directe trombine-remmer).
- Pradaxa® moet mogelijk vóór een chirurgische of andere invasieve ingreep worden gestaakt.
- In geval van een grote bloeding moet Pradaxa® onmiddellijk worden gestaakt.
- Een specifiek antidotum (Praxbind®) is beschikbaar (zie de Samenvatting van de Productkenmerken van Pradaxa® en Praxbind®).
- Pradaxa® wordt hoofdzakelijk via de nieren uitgescheiden; er moet een adequate urineproductie worden gehandhaafd. Pradaxa® is dialyseerbaar.

5

Vul dit gedeelte in of vraag uw arts om dit voor u te doen

Patiëntgegevens

6

naam van de patiënt

geboortedatum

(indicatie voor de antistolling)

dosis van Pradaxa®

7